


ACUTE ZORG BIJ VENEUZE OF ARTERIELE BLOEDING ('BLOW-OUT') BIJ MALIGNIE HOOFD-HALSTUMOREN

Na behandeling of door ingroei van een maligne halstumor kan een zogenaamde 'blow-out' optreden. Van tevoren is het besluit genomen dat er geen curatief gerichte behandeling meer geboden wordt [de patient mag overlijden]. Patient wordt zo mogelijk op een eenpersoonskamer verpleegd. Op de kamer zijn donkere (hand)doeken en handschoenen aanwezig. In de medicijnkamer staat een bekkentje met daarin twee ampullen **Midazolam** 50Mg/10cc en een 10cc spuit met opzuignaald klaar.

In *principe* is de patient van het risico op 'blow-out' op de de hoogte (**uitzondering therapeutische exceptie**). Belangrijk is dat de naaste familieleden **altijd** van dit gevaar op de hoogte zijn. Het ontstaan van de bloeding is vrijwel altijd een zeer ingrijpende ervaring voor aanwezige familieleden.

Er ontstaat een bloeding (arterieel of veneus)

Verpleegkundige blijft bij patient en dekt de bloedende plaats af (donkere handdoeken), alarmeert 2^e verpleegkundige via noodbel, 2^e verpleegkundige belt de dd arts, vangt familie op en brengt het bekkentje met spuiten en ampullen **Midazolam** naar de patientenkamer.



Anticiperend beleid bij patiënten met een hoofd/halstumor in de palliatieve fase met een risico op een fatale bloeding

